

Simplified Evaluation of CONsciousness Disorders (SECONDS)

.....

Commande 1: /3
 2: /3
 3: /3
 Commande écrite: /3
 → Le patient répond au moins 2x à l'une des commandes
 (= score 6)

Si réponse à la commande

Code oui :
 Code non :
 Réponses : .../5 o Verbales o Autobiographiques
 Correctes : .../5 o Ecrites o Situationnelles
 → Le patient répond (même erronément) à au moins 3 questions (= score 7)
 → Le patient répond correctement aux 5 questions (= score 8)

Horizontal : .../2 Vertical : .../2
 o Spontanée o Miroir □ Ouverture manuelle des yeux
 → Le patient présente au moins 2 poursuites visuelles d'au moins 2 secondes (= score 4)

Sup G : .../1 Sup D : .../1
 Inf G : .../1 Inf D : .../1
 o Spontanée o Miroir □ Ouverture manuelle des yeux
 → Le patient présente au moins 2 fixations visuelles d'au moins 2 secondes (= score 3)

Si aucune réponse à la commande

Localisation: G : .../1 D : .../1
 Anticipation: G : .../1 D : .../1
 → Le patient approche la zone stimulée au moins 1x avec la main non stimulée (= score 2)
 → Le patient présente 2 anticipations (= score 6)

.....
 Nb :
 → Le patient présente au moins 1 comportement orienté
 (= score 5)

0-25% / 25-50% / 50-75% / 75-100%
 o Spontanément
 o Stimulation Auditive / Tactile / Douleur
 → Le patient présente au moins 1 ouverture des yeux durant l'ensemble de l'évaluation (= score 1)

A. Observation

B. Réponse à la commande (score 6)

3 x 3 commandes verbales
 10'' intervalle entre commandes
 (1 x 3 commandes écrites si 0/3)
 Stop si 2 commandes 3/3



C. Communication


Intentionnelle (score 7)

Fonctionnelle (score 8)

Questions autobiographiques
Prénom (non), date naissance (oui), prénom (oui), date naissance (non), enfants (oui/non)
 Si réponses erronées: questions situationnelles
Lieu (oui), porter chapeau (oui), lieu (non), toucher main (oui), toucher visage (non)

D. Poursuite visuelle (score 4)

Personne/miroir, 30 cm du visage
 Chaque mouvement sur l'axe horizontal ou vertical = 4''
 (→←↓↑)



E. Fixation visuelle (score 3)

Personne/miroir, 30 cm du visage
 Stimulus présenté dans chaque quadrant



F. Localisation à la douleur (score 2)

Informez le patient
 5'' pression sur lit de l'angle
 1 essai sur chaque main



G. Comportements orientés (score 5)

Ex: se gratter, saisir les draps, tenir le lit, rire ou pleurer de manière contextualisée,...



H. Eveil

Ouverture des yeux (score 1)

Aucun éveil (score 0)

Noter le pourcentage de temps d'ouverture des yeux et les stimulations administrées

Diagnostic : Coma (0) / ENR (1) / ECM- (2-5) / ECM+ (6-7) / EECM (8)

Index additionnel : ... /100