

意识障碍简化评估量表 (SECONDS)

姓名: _____		日期: ___/___/___ 时间: ___:___ 到 ___:___		评估者: _____			
诊断	评分	条目	说明	次数	最大	得分?	标准
COMA	0	无觉醒		-	-		
UWS/VS	1	觉醒	疼痛刺激	-	-		
			触觉刺激	-	-		
			听觉刺激	-	-		
			自发	-	-		
MCS-	2	疼痛定位	右手		1		至少1次
			左手		1		
MCS-	3	视觉对象定位	左上		1		至少2次定位 (每次至少2秒)
			右上		1		
			左下		1		
			右下		1		
MCS-	4	视觉追踪	横轴		2		至少2次追踪 (每次至少2秒)
			纵轴		2		
MCS-	5	导向性行为	行为: _____		-		至少观察到1次. (任何动作)
			行为: _____		-		
			行为: _____		-		
MCS+	6	遵嘱	指令 1: _____		3		相同的指令至少成功2/3次
			指令 2: _____		3		
			指令 3: _____		3		
			指令 4: _____		3		
MCS+	7	交流不完全准确	"是": _____ "否": _____ 的表达方式		-		3-5个回答, 即使不正确
			不准确的回答		5		
			准确的回答		4		
EMCS	8	交流完全准确	准确的回答		5		5个正确

观察并记录:

总分: _____
 诊断: _____
 附加指标: _____

意识障碍简化评估量表 (SECONDS)

如何计算附加指标?

每个水平, 根据以下对应标明加权分数:

水平	加权值
0	0
1	___
2	___
3	___
4	___
5	___
6	___
7 or 8	___

将加权值相加.
最大指标是 100.

1	觉醒	疼痛刺激	1
		触觉刺激	2
		听觉刺激	3
		自发	4
2	疼痛定位	单手	2
		双手	4
3	视觉对象定位	2次	6
		3次	9
		4次 (全部)	12
4	视觉追踪	2次	8
		3次	12
		4次 (全部)	16
5	导向性行为	一种运动	5
		两种不同的运动	10
		超过两种不同的运动	15
6	遵嘱	1个指令 答对2/3	6
		1个指令 答对3/3	12
		2个指令 答对2/3	18
		2个指令 答对3/3	24
7	交流不完全准确	3或4个回答 (不完全准确)	7
		5个回答 (不完全准确)	14
		3或4个回答 (准确)	21
8	交流完全准确	5个回答 (准确)	29