

患者:..... 评估者:..... 日期:..... 时间:.....

意识障碍简化评估量表

.....
.....

指令 1:/3
2:/3
3:/3
书面指令:/3
→ 患者至少对一个指令有2次反应 (=6分)

记录表达是的方式:
记录表达否的方式:
反应: .../5 口头 关于自身的
正确: .../5 书面 情境类
→ 患者至少对3个问题有反应 (即使错误也可) (=7分)
→ 患者对5个问题都有正确的反应 (=8分)

水平: .../2 垂直: .../2
 自发 镜子 手动睁眼
→ 患者至少表现2次视觉追踪, 每次至少2秒 (=4分)

左上: .../1 右上: .../1
左下: .../1 右下: .../1
 自发 镜子 手动睁眼
→ 患者至少表现2次视觉对象定位, 每次至少2秒 (=3分)

定位: 左: .../1 右: .../1
预期: 左: .../1 右: .../1
→ 患者至少1次用未受刺激的手碰到受刺激的手 (=2分)
→ 患者出现2次预期反应 (=6分)

.....
..... 次数:.....
→ 患者至少表现出1个导向性行为 (=5分)

0-25% / 25-50% / 50-75% / 75-100%
自发的/听觉/触觉/疼痛刺激
→ 在整个评估过程中患者至少睁眼1次 (=1分)

A. 观察

B. 遵嘱 (6分)

3 x 3 的口头指令
每个指令间隔 10"
(如果 0/3, 则 1 x 3 的书面指令)
如果两个指令 3/3 即停止

C. 交流

交流不完全准确 (7分)

交流完全准确 (8分)

关于自身的问题
名字 (否), 出生日期 (是), 名字 (是), 出生日期 (否), 孩子 (是/否)
如果回答错误: 情景类问题
地点 (是), 戴帽子 (否), 地点 (否), 摸手 (是), 摸脸 (否)

D. 视觉追踪 (4分)

人/镜子, 距离脸部 30 cm
每次运动在水平或垂直轴上 = 4" (→←↓↑)

E. 视觉对象定位 (3分)

人/镜子, 距离脸部 30 cm 处
在每个象限内呈现刺激

F. 疼痛定位 (2分)

告知患者
按压甲床 5"
每只手测试 1 次

G. 导向性行为 (5分)

例如, 抓挠, 抓床单, 抓床, 特定场景下笑或哭, ...

H. 觉醒

睁眼 (1分)

无觉醒 (0分)

记录睁眼时间所占的百分比和使用的刺激类型



如果有遵嘱

如果没有遵嘱

诊断: 昏迷 (0) / UWS (1) / MCS- (2-5) / MCS+ (6-7) / EMCS (8)

附加指标评分: ... / 100